






## Infekcija uzrokovana respiratornim sincicijskim virusom – RSV infekcija



RSV je uobičajeni **uzročnik prehlade i kašlja** u djece i odraslih



većina slučajeva se pojavljuje **u zimskim mjesecima** (sporadično tokom cijele godine)




RSV se **prenosi kapljičnim putem** i kontaktom sa zaraženom osobom

**4**

RSV na površinama (igračke, stol) može preživjeti **4 do 7 sati**

**7**



period od kontakta s virusom do pojave prvih znakova bolesti je **3 do 5 dana**

**u većine** uzrokuje **blagu bolest** dišnih puteva

Najčešći simptomi bolesti:




curenje i/ili začepljenost  
nosa

kihanje

smanjen apetit


kašalj

povišena temperatura



**liječenje je simptomatsko** (snižavati povišenu temperaturu, djetetu dati puno tekućine)

**!!! Kada se javiti vašem pedijatru?** - kada *dijete teško diše, odbija piti tekućinu ili mu se simptomi pogoršavaju*



RSV je **najčešći uzročnik upale pluća i bronhiolitisa** u djece do godinu dana

Moguće je ponovno se zaraziti i nakon preboljenja RSV infekcije. Većinom su simptomi lagani poput prehlade, ali mogu biti ozbiljni u starijih osoba ili u djece s kroničnim bolestima.

Za sada ne postoji cjepivo protiv RSV-a za djecu

# Kako zaštititi svoje dijete?



Izbjegavajte druženja vašeg djeteta s djecom koja imaju simptome akutne respiratorne bolesti




Učite djecu da peru ruke SAPUNOM i VODOM u trajanju od najmanje 20 sekundi



Učite djecu da laktom ili maramicom pokriju nos i usta prilikom kihanja kako bi smanjili širenje virusa



Naučite djecu da izbjegavaju diranje lica prljavim rukama



Redovito čistite i dezinficirajte površine u kućanstvu



Neka vaše dijete ostane kod kuće ukoliko razvije simptome akutne respiratorne bolesti kako bismo spriječili daljnje širenje bolesti