

ŠARLAH ili SKARLATINA

Bolest uzrokuje beta hemolitički streptokok iz skupine A. Uglavnom započinje općim simptomima kao što su :

- visoka tjelesna temperatura
- glavobolja
- grlobolja
- bolovi u trbuhu
- povraćanje
- bolovi u mišićima



fig. 8.1.1 - Malinolo-papulozma osipa, crvensti ngantens
k. Lateralno peratanje dlanova

Drugog do trećeg dana bolesti javlja se karakterističan sitnotočkasti osip ružičastocrvenkaste boje koji je najviše prisutan na trupu i ekstremitetima, posebice u pazušnim jamama te preponama. Javlja se kod djece predškolske i školske dobi. Bolest se prenosi zrakom – kihanjem, kašljanjem, slinom i dodirrom. Inkubacija (vrijeme od zaraženosti do pojave prvih simptoma) je između 2-5 dana.



Prijenos i liječenje:

- **Prijenos:** Bolest se prenosi kapljičnim putem (kašalj, kihanje) iz ždrijela zaražene osobe.
- **Liječenje:** Šarlah se uspješno liječi antibioticima (obično penicilin) u trajanju od 10 dana.
- **Komplikacije:** Ako se ne liječi, može dovesti do ozbiljnijih komplikacija poput upale bubrega, reumatske groznice ili upale uha

Zdravstvena voditeljica,
Anamaria Matejaš, univ.bacc.med.techn